

Patikros metu **nemokamai** nustatoma PSA koncentracija kraujyje, prireikus pacientą konsultuoja urologas ir atliekama priešinės liaukos biopsija.
Vėliau, jei reikia, paskiriamas reikiamas gydymas.

Jei Jums kyla neaiškumų dėl dalyvavimo patikroje, galite pasikonsultuoti su šeimos (bendrosios praktikos) gydytoju.

Primename, kad patikra dėl priešinės liaukos vėžio visiškai apmokama Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, pacientui primokėti nereikia.



Jeigu esate 50-75 m. amžiaus vyras, Jums pagal valstybės finansuojamą prostatos vėžio ankstyvosios diagnostikos programą, patikra taikoma kartą per dvejus metus nemokamai. Tačiau, jei šeimoje prostatos vėžiu sirgo tėvas ar brolis, Jums ši programa taikoma nuo 45 m.

Tereikia kreiptis į savo šeimos gydytoją (terapeutą) ir pasitikrinti, kol dar nevēlu!

Pagalvokite apie visas moteris, kurias Jus myli!

NEDELSK IR PASITIKRINK!



Lietuvininkų g. 8, Šilutė

Tel./Faks. (8 441) 52 217;


El. p.: visuomenessveikatosbiuras@gmail.com

www.silutessveikata.lt

PRIEŠINĖS LIAUKOS (PROSTATOS)
VĖŽIO
ANKSTYVOSIOS DIAGNOSTIKOS
PREVENCIJA

**PRIEŠINĖS LIAUKOS
(PROSTATOS)
VĖŽYS**

AR ŽINAI VISKĄ APIE JĮ?



2012 m.
Šilutė

Šiuo metu Lietuvoje **priešinės liaukos (prostatos) vėžys** yra dažniausia vyrų onkologinė liga. Per metus nustatoma apie 2000 naujų atvejų, sergamumas šia liga nuolat auga.

Prostatos vėžys paprastai aptinkamas vyrams, vyresniems kaip 50 metų, jaunesniems pasitaiko retai. Prostatos vėžys, kitaip negu kitų organų vėžys, gali ilgus metus tūnoti prostatoje nesukeldamas jokių simptomų. Didžioji šių navikų dalis auga labai lėtai, taigi būtent jaunesniems vyrams nesukelia jokių problemų.

Tik nedidelei vyrų daliai prostatos vėžys vystosi sparčiai, kai kuriais atvejais išplisdamas į kitus organus, ypač į kaulus.

Jei patikros metu nustatomas ankstyvųjų stadijų prostatos vėžys, jo gydymas gali būti efektyvus.


Deja, pacientas ilgą laiką nejaučia jokių ligos simptomų (jie atsiranda, kai vėžinis mazgas būna pakankamai didelis, kad galėtų spausti šlaplę ir trikdyti šlapinimąsi), todėl dažnai (Lietuvoje apie 50% atvejų) aptinkamas vėlyvųjų stadijų prostatos vėžys, kurio visiškai išgydyti nebeįmanoma...

Vyrų, peržengusių 50 metų amžiaus ribą, prostata dažniausiai būna padidėjusi, išvešėjusi ne dėl vėžio, bet dėl daug dažniau pasitaikančios gerybinės prostatos hiperplazijos (GPH).

SIMPTOMAI

Abiem atvejais, ar prostata būtų padidėjusi dėl vėžio, ar dėl GPH, simptomai panašūs:

- ❖ Šlapinimasis pasunkėja, nes šlapimo srovė, verždamasi per padidėjusios prostatos spaudžiamą šlaplę, susilpnėja, susiaurėja.
- ❖ Šlapinimasis padažnėja, ypač naktį, nes, susiaurėjus šlaplei, šlapimo pūslėje po šlapinimosi nuolat lieka šlapimo.
- ❖ Skausmingas šlapinimasis.
- ❖ Šlapimas kraujingas (šis simptomas nėra dažnai pasitaikantis).



PROSTATOS VĖŽIO ANKSTYVOJI DIAGNOSTIKA

Tikslas – kuo anksčiau nustatyti prostatos vėžį.

- ❖ Kasmet reguliariai turėtų būti tikrinama 50-75 m. vyrų prostatos specifinio antigeno (PSA) koncentracija kraujyje, pagal kurią galima numatyti ankstyvosios stadijos prostatos vėžį.
- ❖ Tai leistų šių ligą efektyviai gydyti ir pasiekti, kad pacientas visiškai pasveiktų.
- ❖ Jei nustatytas PSA kiekis bus 3 ng/ml ar didesnis, pacientas bus siunčiamas konsultuotis pas urologą ir atlikti prostatos biopsiją.
- ❖ Padidėjęs PSA kiekis leidžia tik iš anksto nuspėti prostatos vėžį.
- ❖ Prostatos biopsija – vienintelis būdas objektyviai patvirtinti prostatos vėžio diagnozę.